

Бременност: Интравенозно желязо не трябва да се използва по време на бременност, освен в случай на категорична необходимост. Ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна, важно е да обсъдите това с Вашия лекар.

Трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар или медицинска сестра, ако:


- имате някакви признаци или симптоми на алергична реакция по време на или скоро след лечение с интравенозно желязо

Например: уртикария или обрив, сърбеж, замаяност, световъртеж, оток на устните, езика, гърлото или тялото, затруднено дишане, задух или хрипове.

- Вашият лекар ще Ви наблюдава за признаци и симптоми на алергична реакция в продължение на най-малко 30 минути след всяко приложение на интравенозно желязо.

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции
Бихме искали да напомним, че пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ).

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
e-mail: bda@bda.bg

 www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Интравенозно (IV) желязо

**Важна информация за пациентите
относно възможния риск от
сериозни алергични реакции към
интравенозно желязо (лекарство,
прилагано чрез игла във вената)**

ferric carboxymaltose, iron dextran, ferric
derisomaltose iron sucrose

Моля, прочетете внимателно тази
листовка и обсъдете с Вашия лекар
въпросите, които може да имате.

Трябва също да прочетете информацията
за пациента, която се доставя с
конкретното IV желязо, което Ви е
предписано. Това съдържа
важна допълнителна информация
по отношение на лекарствения продукт

Интравенозно желязо се използва за лечение на железен дефицит, когато пероралните препарати са неефективни или не могат да бъдат използвани.

Интравенозното желязо може да предизвика алергични реакции и трябва да се прилага от лица, обучени да оценяват и овладяват тези реакции.

При някои пациенти тези алергични реакции могат да станат тежки или животозастрашаващи (известни като анафилактични реакции) и да причинят проблеми със сърцето и кръвното Ви налягане, и/или да Ви накарат да припаднете или да загубите съзнание.

Вие може да имате повишен риск от получаване на алергична реакция, ако имате:

- известни алергии, включително лекарствени алергии
- анамнеза за тежка астма, екзема или други алергии (например прах, полени, косми от домашни любимци), или
- имунни или възпалителни заболявания (напр. ревматоиден артрит, лупус еритематозус и други)

Трябва да информирате Вашия лекар, преди да Ви предпише или приложи интравенозно желязо, ако имате тези алергии или заболявания.

Вашият лекар ще прецени дали ползата за Вас е по-голяма от риска.

Не трябва да Ви се предписва или прилага интравенозно желязо, ако:

- сте алергични (свръхчувствителни) към продукта или към някоя от останалите съставки на това лекарство
- сте изпитвали сериозни алергични реакции (на свръхчувствителност) към други желязосъдържащи интравенозни лекарства в миналото*
- имате претоварване с желязо (твърде много желязо в тялото Ви)
- Вашата анемия не е причинена от железен дефицит

Трябва да информирате Вашия лекар, преди да Ви предпише/приложи интравенозно желязо, ако имате тези алергии или заболявания.

*** Важно е да знаете, че реакция може да се получи дори и ако не сте имали никакви проблеми с интравенозно желязо в миналото.**